

1. 散布前に必ず農薬ラベルを確認！
2. 散布時に、近隣作物や住宅街への飛散防止を徹底！
3. 散布後に必ず散布器具（タンク、ホース等）を洗浄！
4. 防除履歴は、正確に記帳！

麦作ごよみ




筑前あさくら農業協同組合
朝倉地域担い手・産地育成協議会

月 旬	11月			12月			1月			2月			3月			4月			5月			6月
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上
生育状況	← 分けつ期 茎数確保 → ← 幼穂形成期 → ← 節間伸長期 → ← 穂ばらみ期 → ← 小麦出穂期 → ← 小麦成熟期・収穫期 → ← 大麦出穂期 → ← 大麦成熟期・収穫期 → 小麦播種 大麦播種																					
主な作業	明渠の施工 弾丸暗渠 万能堆肥 土壌改良資材の施用 除草剤(播種直後) 麦踏み 追肥 土入れ 麦踏み 土入れ 麦踏み 土入れ 雑草種子が混入すると共乾施設での荷受けができません！ 赤かび病防除 ちくし春香穂揃期追肥 ← 抜き取り(マツノシロダマ) → 弾丸暗渠 ミチヤナギ トゲミノキツネノボタン アメリカフウロ イヌタデ カラスノエンドウ (種子) ママコノシリヌグイ (種子) 網斑病(大麦のみ) 網斑病による下葉の枯れ上がり 黄斑病(小麦のみ) 赤かび病(大麦) 赤かび病(小麦)																					

① 共乾施設の誘導計画に沿った麦の作付け	③ 単収（収量）のアップ 目標収量 大麦 500kg/10a 小麦 500kg/10a
② 品質のアップ（評価項目達成のため） 小麦 目標タンパク値 ちくし春香 12.0%以上 チクゴイズミ・ニシホナミ 9.7%以上 大麦 目標容積重 709g/l以上	④ 生産履歴の記帳・GAP（生産工程管理）の実施 ⑤ 環境負荷低減、地力改善への取り組みとして、 麦わらすき込みの実施

- ・溝堀機による明渠施工
- ・弾丸暗渠(2m以内の間隔)
- ・畝立て播種
- ・ほ場の周囲と畝間の排水溝整備



(10aあたり)

	資 材 名	施 用 量	備 考
有機質	万 能 堆 肥	2t	地力増強・土壌物理性の改善
	稲 わ ら	全量	耕起前に硫酸10kg/10aを施用（稲わらの分解促進）
土壌改良	ミ ネ ラ ル G	200kg	鉄分・ケイ酸・微量要素の供給
	ケ イ 鉄		石灰・ケイ酸・鉄分の供給
	生 石 灰	120kg	酸性土壌対策

・土壌診断に基づく土づくり・・・適正pHを保つ(6.0～6.5)。腐植3%以上を目標とする。

・種子更新・・・栽培履歴証明・品種固有の特性維持

麦 種	対象病害虫	農 薬 名	種子10kg当たりの使用量
大 麦	網 斑 病	トリフミン水和剤	50g
小 麦	黒 穂 病		
	鳥 害	キヒゲンR-2フロアブル	200ml
小 麦	ヤギシロトビムシ	クルーザーFS30	60ml

(10aあたり)

項 目	小 麦	大 麦
播種適期	11月15日～25日	11月25日～12月5日
播 種 量	6～7kg	

- ※ 共乾施設の荷受期間内に収穫できるよう、**適期に播種する。**
- ※ 播種量が多すぎると倒伏しやすくなる。
- ※ 播種適期より遅播きの場合は播種量を多くする。
- ※ 播種深度は3～4cmとする。

小麦1升=1.5kg
大麦1升=1.3kg

(10aあたり)

麦 種	品 種	基 肥	追肥① (1月中下旬)		追肥② (3月上旬)	成分量(10a当たりkg)		
						N	P	K
大 麦	はるか二条	ちくこのめぐみ444 (14-14-14) 40kg	①一発追肥体系		一	一発追肥体系		
小 麦	チクゴイズミ		きばる麦追肥一発405 (24-0-5) 30kg		—	12.8	5.6	7.1
	ニシホナミ		又は ②2回追肥体系			2回追肥体系		
	ちくし春香		ちくこのめぐみ444 30kg		硫安 10kg	11.9	9.8	9.8

注) 大豆後作で地力が高いほ場は、基肥を半量とする。

【ちくし春香の穂揃期追肥】 (10a当たり)

穂揃期追肥① 出穂後5～10日後	穂揃期追肥② 1回目の7～10日後
尿素葉面散布 1回目 5kg/100ℓ (赤かび病防除と同時に)	尿素葉面散布 2回目 5kg/100ℓ (赤かび病防除と同時に)
硫安25kg又は尿素15kg	—

注) 硫安、尿素は朝露が乾いてから散布すること。

注) 尿素葉面散布は気温の高い日中を避けること。

【省力化施肥例】基肥一発肥料の施肥体系

	品 種	肥料名	10a当たり 施用量	成分量(10a当たりkg)		
				N	P	K
小麦	チクゴイズミ ニシホナミ ちくし春香	新 麦名人 (27-6-6)	40～45kg	10.8	2.4	2.4
				12.2	2.7	2.7

※大麦、大豆後には基肥一発肥料は使用しない。
(遅れ穂、青未熟粒の発生、生育の調整が難しいため)
※基肥一発肥料は年次により減収する。

(10aあたり)

播種前・播種後除草 (10a当たり)

除 草 剤 名	対象雑草	使用量並びに水量		使用時期	注 意 事 項
ラウンドアップマックスロード バスター液 剤 ブリグロックス L	イネ科 広葉雑草	500ml 1000ml	水 100ℓ	耕起前	●低圧で風向きなどに注意し付近の作物にかからないように散布する。
リベレーター G（粒 剤）	イネ科	5kg	均一に散布	播種後～麦2葉期 雑草発生前～ イネ科雑草1葉期まで	●リベレーターは、散布後、大麦で白化症状を生じやすいが、その後の生育・収量に影響はない。 ●土壌が乾燥しているときは水量を多くする。 ●薬害回避のため、覆土は3cm程度とする。 ●重粒散布やムラ散布に注意する。
リベレーターフロアブル	広葉雑草	80ml	水 100ℓ		
リベレーターフロアブル + トレファノサイド乳剤	イネ科 広葉雑草	80ml + 300ml	水 100ℓ	播種後～麦2葉期 雑草発生前～ イネ科雑草1葉期まで	●雑草の発生が多い圃場に混用し散布する。

生育期除草

(10aあたり)

除 草 剤 名	対象雑草	使用量並びに水量		使用時期		注 意 事 項
ハ ー モ ニ ー D F	イネ科・広葉雑草 (キツネノボタン ミチサナギ アメリカフウロ タデ科 カラスノエンドウ)	5~10g	水100ℓ	小麦 播種後～穂ばらみ期 (収穫45日前まで)	大麦 播種後～節間伸長前	●抵抗性スズノメツボウ(ゴビエ)には効果がない。 ●散布後黄化する場合がある。 ●散布器具類は、出来るだけ早く洗浄する。 (消石灰水) ●散布後、1週間以内の麦ふみ、土入れは行わない。
バ サ グ ラ ン 液 剤	広葉雑草 (キツネノボタン アメリカフウロ)	100~200ml	水100ℓ	小麦 生育期 (収穫45日前まで)	大麦 生育期 (収穫90日前まで)	●雑草3~6葉期の間に、雑草にかかるように均一に散布する。 ●散布後、曇天や降雨が続くと、効果が劣ることがあるので、晴天時を見計らって散布する。
エコバートフロアブル	ヤエムグラ (ノボリグサ) (2~6節)	50~100ml	水100ℓ	節間伸長開始期まで (広葉雑草2~4葉期、 ヤエムグラ2~6節)		●散布後、麦の葉に一過性の軽微な白斑・白点を生じるがその後の生育・収量に影響はない。
M C P ソ ー ダ 塩	カラスノエンドウ	200~300g	水100ℓ	幼穂形成期 (収穫45日前まで)		●気温が高いと効果が安定的。 ●3月上旬中旬の散布が効果的。

※散布の際は他作物や建物へ飛散しないよう十分注意する。

※共乾施設での種子混入防止のため、雑草が多いほ場は播種直後と中期の2回雑草処理を行う。

※ネズミムギ等が発生する圃場では、1月上旬の雑草発生前にトレファノサイド乳剤を300ml/100ℓ散布する。

- 1) 麦踏みは、12月下旬～2月下旬の間に3回程度必ず行う。
- 2) 土入れは、除草・作溝を兼ねて1月下旬から3月上旬まで
- 3) 土入れ・麦踏みは土壌が乾いている時に行う。

赤かび病防除を必ず行ってください!!
防除を行っていない麦は共乾施設等での荷受けはできません。
※赤かび病に弱いちくし春香とはるか二条は2回防除する。
※その他の品種については、開花期以降も雨が多い場合は2回防除が必要。

(10a当たり)						
防除時期	使用順	農 薬 名	散 布 量		使用回数	
					大麦	小麦
赤かび病：4月中旬頃 小麦：出穂7～10日後 大麦：出穂14日後 (2回目は1回目の7～10日頃)	1・2回目	ワークアップ粉剤DL	3kg		3回	3回
	1回目	ミラビスフロアブル	1500～2000倍	水100ℓ	2回	2回
		トップジン M 水和 剤	1000倍	水100ℓ	1回	2回
	2回目	ワークアップフロアブル	2000～3000倍	水100ℓ	3回	3回

- ※網斑病・黄斑病の発生した圃場では、3月中下旬頃（網斑病：3月中下旬・黄斑病：3月下旬）に
　　ルト乳剤25を1000倍で散布する。
- ※ミラビスフロアブル・ワークアップフロアブルを開花期防除に使用すると、網斑病・黄斑病に効果がある。
- ※網斑病・黄斑病が多発すると減収する。
- ※ドローン散布の場合は、希釈倍率が変わる。

- 1) 出穂後収穫前までにカラスノエンドウ・ママコノシリヌグイの抜取りを徹底する。
- 2) 麦の早刈りは品質を著しく低下させる。
- 3) 刈取適期は、成熟期より**3～4日遅らせた時期**。(穀粒水分25%以下)
- 4) 土づくりのため硫酸10kg/10aを施用して**麦わらをすき込む**。

麦 種	品 種 名	出穂期	成熟期	稈長cm	穂長cm	耐倒伏性	穂発芽性
大 麦	はるか二条	4.3	5.15	79	6.5	強	やや難
	ちくし春香	4.4	5.29	73	9.3	極強	難
小 麦	チクゴイズミ	4.6	5.29	88	8.5	やや強	中
	ニシホナミ	4.9	6.1	79	8.4	強	難



農薬、肥料、資材の注文はJAへ!!

注) 農薬、肥料は令和8年8月24日現在の登録状況に基づき、記載しています。